

NOUVELLES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA MAMMOGRAPHIE ET LE VACCIN COVID

Après avoir découvert la présence de ganglions axillaires bénins chez certaines femmes récemment vaccinées pour la COVID, la Société canadienne de l'imagerie mammaire (SCIM) et l'Association canadienne des radiologistes (ACR) ont émis les recommandations suivantes afin d'éviter d'inutiles inquiétudes:

1. Lorsque c'est possible, programmer la mammographie de dépistage avant l'administration d'une dose de vaccin ou 6 semaines après une des deux doses du vaccin.
2. Il est recommandé de ne pas retarder la mammographie si vous présentez des changements récents à vos seins, ou si la date prévue pour votre mammographie de dépistage est dépassée en raison des retards dus à la pandémie.
3. Si vous avez déjà subi une mastectomie partielle, l'exérèse de ganglions lymphatiques à l'aisselle, si vous présentez un lymphoedème post-traitement, ou si vous avez eu un diagnostic récent de cancer du sein et êtes en attente de traitement, il serait recommandé d'envisager de recevoir le vaccin dans le bras du côté non affecté, ou dans les cuisses.

Vous pouvez discuter avec votre MD/IPS si vous avez des questions à ce sujet.